

# Semaine 4 du 7 octobre 2024 (S41)

## II Rappels et compléments d'algèbre linéaire

Le chapitre II reste au programme, ainsi que les exercices à connaître suivants :

### 10. Exercices à connaître

#### 10.5. Noyaux itérés

Soit  $f$  un endomorphisme d'un espace de dimension finie  $n$  non nulle. On définit, pour tout entier naturel  $p$  :

$$F_p = \text{Ker}(f^p) \quad \text{et} \quad G_p = \text{Im}(f^p)$$

(  $f^p$  désigne l'itérée d'ordre  $p$  de  $f$  :  $f^0 = \text{Id}$  et,  $f^{p+1} = f \circ f^p$  ).

- 1) Démontrer que, des deux suites de s.e.v.  $(F_p)$  et  $(G_p)$ , l'une est croissante et l'autre décroissante (pour l'inclusion).
- 2) Démontrer qu'il existe un plus petit entier naturel  $r$  tel que  $F_r = F_{r+1}$ , et démontrer qu'alors, pour tout entier naturel  $p$  supérieur ou égal à  $r$ ,  $F_p = F_{p+1}$ .
- 3) Démontrer qu'il existe un plus petit entier naturel  $s$  tel que  $G_s = G_{s+1}$ , et démontrer qu'alors, pour tout entier naturel  $p$  supérieur ou égal à  $s$ ,  $G_p = G_{p+1}$ . Y-a-t-il un lien entre  $r$  et  $s$  ?
- 4) Démontrer que  $G_s$  et  $F_r$  sont supplémentaires dans  $E$ .

#### 10.6. Endomorphismes nilpotents

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n \geq 1$ . On dit que  $f \in \mathcal{L}(E)$  est nilpotent lorsqu'il existe  $k \geq 1$  tel que  $f^k = 0$ .

- 1) Montrer qu'il existe un unique entier  $p \in \mathbb{N}^*$  tel que  $f^{p-1} \neq 0$  et  $f^p = 0$ . Cet entier est appelé *indice de nilpotence* de  $f$ .

Dans cet énoncé, on considère  $f \in \mathcal{L}(E)$  nilpotent d'indice  $p$ .

- 2) Montrer qu'il existe  $x \in E$  tel que  $\mathcal{F} = (x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$  est une famille libre.
- 3) En déduire que  $p \leq n$ .
- 4) On suppose dans cette question que  $p = n$ . Déterminer  $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f)$  et  $\text{rg}(f)$ .
- 5) Donner un exemple d'espace vectoriel  $E$  de dimension  $n$  et d'endomorphisme  $f \in \mathcal{L}(E)$  nilpotent d'indice  $n$ .

#### 10.7. Endomorphismes de rang 1

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  de rang 1.

- 1) Montrer qu'il existe  $C \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  et  $L \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$  vérifiant  $A = CL$ .
- 2) Montrer qu'il existe  $\alpha \in \mathbb{K}$  tel que pour tout entier naturel non nul  $n$ ,  $A^n = \alpha^{n-1}A$ .
- 3) Montrer que  $A^2 = \text{tr}(A)A$ .
- 4) Après avoir calculé  $(1 + \text{tr} A)(A + I_n) - (1 + \text{tr} A)I_n$ , déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que  $A + I_n$  soit inversible. Le cas échéant, déterminer  $(A + I_n)^{-1}$ .

#### 10.9. Une caractérisation de la trace

Trouver toutes les formes linéaires  $f$  sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  vérifiant :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), f(AB) = f(BA).$$

*Indication* : pour deux matrices élémentaires  $E_{i,j}$  et  $E_{k,\ell}$ , calculer le produit  $E_{i,j}E_{k,\ell}$ .

S'y ajoute :

### III Intégrales généralisées

#### 11. Fonctions continues par morceaux sur un segment

#### 12. Rappels de première année

##### 12.1. Le théorème fondamental

##### 12.1a. Primitives

##### 12.1b. Existence de primitives.

##### 12.1c. Fonctions dont la variable intervient dans les bornes d'une intégrale (cas particulier d'intégrales dépendant d'un paramètre).

##### 12.2. Intégration par parties

##### 12.3. Changements de variable

#### 13. Extension aux fonctions continues par morceaux sur un intervalle

#### 14. Intégrales généralisées sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$

##### 14.1. Définition

##### 14.2. Cas des fonctions positives

##### 14.3. Cas général

#### 15. Intégrales généralisées sur un intervalle quelconque

#### 16. Propriétés

#### 17. Méthodes de calcul

##### 17.1. Calcul par primitivation

##### 17.2. Intégration par parties

##### 17.3. Changement de variable

#### 18. Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrables

##### 18.1. Définition

##### 18.2. Un exemple de référence : les intégrales de Riemann

##### 18.3. Théorèmes de comparaison

##### 18.4. Étude de l'existence d'une intégrale

#### 19. Exercices à connaître

##### 19.1. Intégrales de Wallis

On pose, pour tout entier naturel  $n$ ,  $I_n = \int_0^{\pi/2} (\sin x)^n dx$ .

1) Calculer  $I_0$  et  $I_1$ . Donner une relation de récurrence entre  $I_n$  et  $I_{n-2}$ . En déduire la valeur de  $I_n$  selon la parité de  $n$ .

2) Montrer que la suite  $(I_n)$  est décroissante. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_{n-1}}{I_n}$ .

3) Montrer :  $\forall n \geq 1, nI_n I_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n \sqrt{n}$ .

- 4) Montrer que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n(I_{2n})^2 = \frac{\pi}{2}$ .  
 En déduire que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ n \left( \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2.4.6 \dots 2n} \right)^2 \right] = \frac{1}{\pi}$   
 (formule de Wallis).

### 19.2. Détermination de la nature d'une intégrale

Préciser la nature des intégrales suivantes :

- 1)  $\int_0^1 \frac{dt}{(1-t)\sqrt{t}}$
- 2)  $\int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{(1-t)^3}} dt$
- 3)  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2\sqrt{1+t^2}}$  (et la calculer).

### 19.3. Intégration par parties et équivalent

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on note

$$I_n = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^n(1+x^2)} dx$$

- 1) Montrer l'existence de  $I_n$ , pour tout  $n$ .
- 2) Déterminer la limite de  $(I_n)_n$ .
- 3) À l'aide d'une intégration par parties, trouver un équivalent simple de  $I_n$ .

### 19.4. Intégrabilité de $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$

- 1) Montrer que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$  est une intégrale convergente.
- 2) Montrer que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^2 dx$ .
- 3) Montrer que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$  est une intégrale divergente.
- 4) En déduire la nature de  $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ . La fonction  $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$  est-elle intégrable sur  $]0, +\infty[$ ?